

以下為閣下可撥打的其他電話號碼：

國家HIV/AIDS熱線：(800) 342-243 (英文)

國家HIV/AIDS熱線：(800) 344-7423 (西班牙文)

項目諮詢：(800) 822-7422

加州AIDS：(800) 367-2437

三藩市AIDS/HIV夜線：

5p-5a (415) 434 -AIDS

自殺預防：(415) 781-0500

HIV評估與預防服務：(415) 206-8972

閣下的跟蹤預約：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

時間：\_\_\_\_\_

地點：

BAPAC office  
SFGH Main Hospital  
1001 Potrero Avenue  
6th floor, Room 6D-33  
(415) 206-8919

Stanley Jackson Clinic  
995 Potrero Avenue  
Building 80, 1<sup>st</sup> floor Blue Team  
(415) 206-5680

如果閣下不能赴約或需要重新安排，請致電我們。

三藩市  
加州大學



**BAPAC**  
Bay Area Perinatal  
AIDS CENTER

快速 HIV 檢測  
以及  
何為快速 HIV 檢測?  
*Your Rapid HIV Test*  
*What does it mean?*  
(Chinese)

閣下收到難以接受的消息。

人們對此訊息的反應不一。我們希望此訊息有助於回答閣下的問題。

### 快速HIV檢測呈陽性有何意味？

若閣下的快速HIV檢測呈陽性，意味著閣下可能是HIV感染者。

因為我們目前已獲知了這個檢測結果，因此我們要為閣下及閣下的孩子進行治療，減少閣下孩子感染HIV的機率，萬一閣下確實是HIV感染者的話。

我們會對閣下的血樣以不同方式檢測和跟蹤，以獲知更加明確的結果。此項檢測時間大約一週左右。



如果我還有更多問題，應該去何處詢問？

等待與疑惑非常痛苦。  
閣下可能有煩惱的想法。

切記，任何人都可能感染 HIV！  
感染 HIV 並不意味著閣下不是好人！！！！

**BAPAC 在此為閣下提供幫助。**

閣下可私下致電獲取相關信息。

如果閣下僅需要談話，我們會很樂意與閣下會面。

### **BAPAC 電話號碼：**

Cynthia Feakins，護理師：(415) 206-3631

Rebecca Schwartz，社工：(415) 206-4240

Sharon Gambles，同業倡護員：(415) 206-4472

Gloria Fisher，病人協調員：(415) 206-8919



如果第二次跟蹤檢測結果呈陰性，閣下可能處於HIV感染初期或未感染HIV。

閣下身體對HIV病毒產生反應之後，成人HIV檢測方會呈陽性，而這可能需要數月。通常而言，閣下防禦系統在三個月內產生「抗體」抵抗HIV。HIV檢測是來測試是否具有這些抗體。如果閣下身體仍未產生抗體，雖然閣下攜帶HIV，檢測呈陰性。

爲了幫助閣下瞭解是否處於感染初期，將對閣下進行血液測試，尋找閣下身體中的HIV病毒。此外，還可能進行若干其他檢測，以提供更多信息。這些檢測可能需要兩週時間。

閣下亦將於一個月內進行另一項HIV抗體檢查。大部分人在HIV進入身體後三個月檢查呈「陽性」。有時，需要六個月時間檢查呈陽性。

閣下在預約會面時，可與閣下醫師討論檢查相關事宜及進行另一項HIV檢測的最佳時機。

## 胎動與生產時將對本人造成何種影響？

閣下的醫師將爲閣下提供護理，以幫助降低HIV病毒傳給閣下嬰兒的機率。

這包括在閣下胎動時爲閣下提供的靜脈藥物（透過靜脈注射）及口服葯的結合療法。進行此結合療法的好處在於，閣下嬰兒在即將出生時會獲得藥物治療，幫助防止HIV的感染。

如果有些女性並未胎動且胞衣並無破裂，則這些女性可透過剖腹產降低HIV病毒傳播的機率。閣下醫師將告知閣下此舉是否對閣下有益。

## 將對嬰兒造成何種影響？

嬰兒出生後將口服葯水，以降低HIV感染的機率。如果閣下嬰兒無法口服葯水，可透過靜脈注射藥物。

閣下的嬰兒將進行HIV檢測。檢查前，閣下將被要求簽署一份文件。



## 我可以哺乳嗎？

閣下目前不可以哺乳。如果閣下攜帶 HIV，閣下嬰兒可能會從母乳中感染 HIV。

為將閣下嬰兒感染 HIV 的機率降至最低，閣下應該使用奶瓶（奶粉）給嬰兒餵食，直至閣下知曉第二次 HIV 檢測最終結果出來。

若閣下想讓乳汁流出，閣下可在等待檢測結果的同時泵乳房，擠出奶。檢測結果出來後，閣下可與醫師討論喂嬰兒的最佳辦法。

## 如何證實我的HIV結果？

閣下將在約一週內進行預約。即向閣下提供最終檢查結果之時。

如果跟蹤檢測的結果亦呈陽性，意味著閣下身體已受到HIV感染。進一步的血液測試將有助於閣下知曉HIV病毒是否使閣下身體的防禦系統變差，並幫助閣下及閣下的醫療護理機構確定藥物是否對閣下的健康有幫助。

有些人具有健康的防禦（免疫）系統，即使他們攜帶HIV亦無需用藥。

閣下每隔幾個月將進行血液測試，以確定閣下是否需要用藥。閣下用藥時，檢查將顯示藥物對閣下的作用如何。

