

Algunos otros números telefónicos a los que puedes llamar:

Línea Nacional de Emergencia del HIV/AIDS: (800) 342-2437
(inglés)

Línea Nacional de Emergencia del VIH/SIDA: (800) 344-7423
(español)

Informe de Proyecto: (800) 822-7422

Línea de Emergencia del SIDA en California (800) 367-2437

Línea Nocturna SIDA/VIH en San Francisco: 5 p.m. - 5 a.m.
(415) 434-AIDS

Prevención de Suicidios: (415) 781-0500

Servicio de Valoración y Prevención del VIH: (415) 206-9872

Su cita de seguimiento:

Fecha: ___/___/___

Hora: ___/___/___

Ubicación:

Oficina de BAPAC
Hospital Principal HGSF
1001 Potrero Avenue
6th Floor, Room 6D-33
Tel. (415) 206-8919

Stanley Jackson Clinic
955 Potrero Avenue
Building 80, 1st Floor, Blue Team
Tel. (415) 206-5680

Por favor llame si no puede asistir a su cita o si necesita volver a programar.

07/06/04

Universidad de California en
San Francisco



Su Examen Rápido de VIH

¿Qué significa?

Usted acaba de recibir una dura noticia.

Todos reaccionan de manera diferente ante esta noticia. Esperamos que esta información le ayude a responder algunas de sus preguntas.

¿Qué significa un resultado positivo en el examen rápido del VIH?

Si usted obtuvo un resultado positivo en el examen del NIH significa que usted PUEDE ser VIH positivo.

Como tenemos AHORA estos resultados del examen, a usted y a su bebé se les puede dar un tratamiento para reducir la probabilidad de que su bebé adquiera el VIH, en caso de que usted esté infectada con VIH.

Ahora, a su muestra de sangre se le realizará un examen diferente y de seguimiento para que nos de una respuesta más definitiva. Este examen se lleva alrededor de una semana.



¿A dónde debo acudir si tengo más preguntas?

Es difícil esperar con incertidumbre. Usted puede tener problemas para pensar con claridad.

¡Recuerde que CUALQUIERA puede contagiarse del VIH!
¡El tener VIH no significa que usted sea una mala persona!

BAPAC está aquí para ayudarle.

Usted puede obtener información privada por teléfono.

Si sólo necesita hablar, nos dará mucho gusto reunirnos con usted.

**Los número BAPAC
(415) 206-8919**

**Fuera de horario, llame a la Sala de Partos y hable
con el atendiente de BAPAC
(415) 206-8725**



Si el 2º examen de seguimiento de VIH es negativo, usted podría estar en la etapa temprana de la infección por VIH, O usted no tiene el VIH.

El examen del VIH para adultos resulta positivo sólo después de que su organismo ha respondido al virus de VIH, y esto puede llevarse unos cuantos meses. Usualmente para los tres meses, su sistema de defensa fabrica "anticuerpos" contra el VIH. El examen del VIH muestra estos anticuerpos. Si su organismo todavía no ha fabricado anticuerpos, el examen resultará negativo, aunque usted tenga VIH.

Para ayudar a ver si usted está en la etapa temprana de la infección, se le hará un examen de sangre para buscar el virus del VIH en su sangre. Se pueden hacer algunos otros exámenes para obtener más información. Estos exámenes pueden llevarse hasta dos semanas.

Usted también se practicará otro examen de anticuerpos del VIH en un mes. El resultado para la mayoría de las personas será "positivo" tres meses después de que el VIH entra en el organismo. A veces se puede llevar hasta seis meses para que el resultado del examen sea positivo.

En su cita usted puede hablar con su doctor sobre sus exámenes y preguntarle cuándo sería el mejor momento para practicarse otro examen del VIH.

¿Qué me sucederá durante el trabajo de parto y el alumbramiento?

Sus médicos le proporcionarán los cuidados médicos para ayudarle a reducir la probabilidad de que se le transmita el virus del VIH a su bebé.

Esto incluirá una combinación de medicamento intravenoso (a través de las venas) y de medicamento oral que le serán dados mientras usted esté en trabajo de parto. Lo bueno de esta combinación es que su bebé obtendrá el medicamento para ayudar a prevenir la infección VIH al momento del nacimiento.

Algunas mujeres pueden reducir la probabilidad de transmitir el VIH dando a luz a través de una operación cesárea si aún no entran en trabajo de parto y no se les ha roto la fuente de líquido amniótico. Sus doctores le informarán si esto puede ser útil para usted.

¿Qué le sucederá a mi bebé?

Después del nacimiento de su bebé, a él o a ella se le dará medicamento líquido (por la boca) para reducir la probabilidad de una infección por VIH. Si su bebé no puede tomar líquidos, se le puede dar medicina por vía intravenosa (a través de las venas).

A su bebé se le realizarán exámenes para verificar si tiene el VIH. A usted se le pedirá que firme una autorización para que se le puedan realizar los exámenes.



¿Puedo amamantar a mi bebé?

Por ahora usted no deberá dar el pecho materno a su bebé. Si usted tiene el VIH, su bebé puede infectarse a través de su leche materna.

Para darle a su bebé la mejor probabilidad de que no se contagie con el VIH, usted deberá alimentarlo con leche preparada (fórmula) hasta que usted conozca el resultado final del 2º examen de VIH que se lleva a cabo en estos momentos.

Si usted quiere que su leche materna empiece a fluir, usted puede extraer su leche y desecharla mientras espera el resultado del examen. Cuando esté listo el resultado del examen usted puede hablar con su doctor sobre la mejor forma de alimentar a su bebé.

¿Cómo puedo saber el resultado de mi examen de VIH con seguridad?

Usted tendrá una cita en cerca de una semana.
Es entonces cuando le será entregado el resultado del examen final.

Si el resultado del examen de seguimiento también es positivo, esto significa que usted tiene la infección del VIH en su organismo. Los resultados de exámenes de sangre adicionales le ayudarán a saber si el virus VIH está debilitando el sistema de defensa de su organismo. Asimismo, les ayudarán a usted y a su proveedor de servicios médicos a decidir si el medicamento será útil para mantenerle saludable.

Algunas personas tienen un sistema de defensa (inmunológico) sano aún cuando tienen el VIH y no necesitan medicamento.

A usted se le realizará un examen de sangre cada pocos meses para ver si su organismo necesita medicamento. Cuando usted esté tomando medicamento, los exámenes mostrarán cuánto le está funcionando el medicamento.

